

**ЛИСТОВКА**

## Листовка: информация за пациента

**Парнидо 3 mg таблетки с удължено освобождаване**

**Парнидо 6 mg таблетки с удължено освобождаване**

**Парнидо 9 mg таблетки с удължено освобождаване**

палиперидон

**Parnido 3 mg prolonged-release tablets**

**Parnido 6 mg prolonged-release tablets**

**Parnido 9 mg prolonged-release tablets**

paliperidone

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### **Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Парнидо и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Парнидо
3. Как да приемате Парнидо
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Парнидо
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### **1. Какво представлява Парнидо и за какво се използва**

Парнидо съдържа активното вещество палиперидон, което принадлежи към групата на антипсихотичните лекарства.

Парнидо се използва за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години.

Шизофренията е разстройство със симптоми като чуване на неща, виждане или усещане на неща, които ги няма, погрешни убеждения, необичайна подозрителност, усамотяване, несвързана реч, поведенческо и емоционално изравняване. Хората с това разстройство могат също да се чувстват депресирани, тревожни, виновни или напрегнати.

Парнидо също така се използва за лечение на шизоафективно разстройство при възрастни. Шизоафективното разстройство представлява психично състояние, при което човек има комбинация от симптоми на шизофрения (като изброените по-горе) заедно със симптоми на афективно разстройство (чувство за изключително добро настроение, чувство на тъга, чувство на възбуда, разсеяност, безсъние, разговорливост, загуба на интерес към ежедневните дейности, твърде много или твърде малко сън, поемане на твърде много или твърде малко храна и повтарящи се мисли за самоубийство).

Парнидо може да помогне за облекчаване симптомите на Вашето заболяване и да предотврати тяхното възобновяване.

## **2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Парнидо**

### **Не приемайте Парнидо**

- ако сте алергични към палиперидон, рисперидон или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Парнидо.

- Пациенти с шизоафективно разстройство, лекувани с това лекарство, трябва да се следят внимателно за евентуално преминаване от манийни към депресивни симптоми.
- Това лекарство не е проучено при пациенти в старческа възраст с деменция. При пациенти в старческа възраст с деменция, обаче, които са на лечение с други подобни по вид лекарства, може да има повишен риск от инсулт или смърт. (вижте точка 4, Възможни нежелани реакции).
- Ако имате болест на Паркинсон или деменция.
- Ако някога Ви е била поставяна диагноза за състояние, симптомите на което включват висока температура и скованост на мускулите (също известно като невролептичен малигнен синдром).
- Ако някога сте имали необичайно движение на езика и лицето (тардивна дискинезия). Трябва да знаете, че и двете състояния могат да бъдат причинени от този вид лекарства.
- Ако знаете, че в миналото сте имали ниски нива на белите кръвни клетки (което може да е било или да не е било следствие на други лекарства).
- Ако имате диабет или сте предразположени към диабет.
- Ако имате сърдечно заболяване или получавате лечение за сърдечно заболяване, което може да предизвика ниско кръвно налягане.
- Ако имате епилепсия.
- Ако имате затруднения при преглъщане, стомашни или чревни нарушения, които намаляват способността за преглъщане и за преминаване на храната чрез нормалните движения на червата.
- Ако имате заболяване, придружено с диария.
- Ако имате проблеми с бъбреците.
- Ако имате проблеми с черния дроб.
- Ако имате продължителна и/или болезнена ерекция.
- Ако трудно контролирате телесната си температура или прегрявате.
- Ако имате необичайно високи нива на хормона пролактин в кръвта или ако е възможно да имате пролактин-зависим тумор.
- Ако Вие или друг член на Вашето семейство имате анамнеза за кръвни съсиреци, тъй като антипсихотиците се свързват с образуването на кръвни съсиреци.

Ако имате някое от тези състояния, моля уведомете Вашия лекар, тъй като той/тя може да прецени да промени дозата Ви или да Ви наблюдава за известно време.

В много редки случаи при пациентите, приемащи палиперидон, се наблюдава опасно нисък брой на определен вид бели кръвни клетки, необходими за борба с инфекциите в кръвта и затова Вашият лекар може да провери броя на Вашите бели кръвни клетки.

Парнидо може да доведе до повишаване на Вашето тегло. Значителното увеличение на теглото може да има неблагоприятен ефект върху здравето Ви. Вашият лекар трябва редовно да измерва телесното Ви тегло.

При пациенти, приемащи палиперидон, се наблюдава поява на захарен диабет или влошаване на съществуващ захарен диабет и затова Вашият лекар трябва да Ви прегледа за признаци на висока кръвна захар. При пациенти с установен захарен диабет трябва редовно да се следи нивото на глюкоза в кръвта.

По време на операция на окото за помътняване на лещата (катаракта или перде), зеницата (черният кръг в средата на окото), може да не се увеличи до необходимия размер. Също така, по време на операция ирисът (оцветената част на окото) може да загуби тонус, което може да доведе до увреждане на очите. Ако планирате операция на окото, не забравяйте да информирате Вашия очен лекар, че приемате това лекарство

### **Деца и юноши**

Парнидо не е предназначен за употреба при деца и юноши под 15-годишна възраст за лечение на шизофрения.

Парнидо не е предназначен за употреба при деца и юноши, които са под 18-годишна възраст за лечение на шизоафективно разстройство.

Това е така, защото не е известно дали палиперидон е безопасен или ефикасен при тези възрастови групи.

### **Други лекарства и Парнидо**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

Възможно е да се появят отклонения в електрическата дейност на сърцето, когато това лекарство се приема с определени лекарства за сърце, които контролират сърдечния ритъм или други видове лекарства като антихистамини, антималярийни средства или други антипсихотици.

Тъй като това лекарство действа предимно в мозъка, може да възникне взаимодействие с други лекарства (или алкохол) с ефект върху мозъка поради добавъчния ефект върху функциите на мозъка.

Тъй като това лекарство може да понижи кръвното налягане, трябва да се внимава, когато това лекарство се приема с други лекарства, които понижават кръвното налягане.

Това лекарство може да намали ефекта на лекарствата за болест на Паркинсон и за синдрома на неспокойните крака (напр. леводопа).

Ефектите на това лекарство може да се засегнат, ако Вие приемате лекарства, които повлияват времето за преминаване през стомашно-чревния тракт (напр. метоклопрамид).

Намаляване на дозата на това лекарство трябва да се има предвид, когато това лекарство се прилага едновременно с валпроат.

Едновременната употреба на перорален рисперидон и това лекарство не се препоръчва, тъй като комбинацията от двете лекарства може да доведе до увеличаване на нежеланите реакции.

Парнидо трябва да се използва с повишено внимание с лекарства, които повишават активността на централната нервна система (психостимуланти като метилфенидат).

### **Парнидо и алкохол**

Алкохолът трябва да се избягва, когато се приема това лекарство.

### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вие не трябва да приемате това лекарство по време на бременност, освен ако не сте обсъдили това с Вашия лекар. Следните симптоми могат да се появят при новородени, чийто майки са използвали палиперидон през последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, скованост на мускулите и/или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и затруднения в храненето. Ако при Вашето бебе се прояви някой от тези симптоми, може да се наложи да потърсите Вашия лекар.

Вие не трябва да кърмите, когато приемате това лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

По време на лечението с това лекарство може да възникнат замайване и проблеми със зрението (вижте точка 4, Възможни нежелани реакции). Това следва да се има предвид в случаите, когато се изисква пълно внимание, например при шофиране и работа с машини.

### **Парнидо съдържа натрий**

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за таблетка, т.е може да се каже, че практически не съдържа натрий.

## **3. Как да приемате използвате Парнидо**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **Употреба при възрастни**

Препоръчителната доза при възрастни е 6 mg веднъж дневно, приета сутрин. Дозата може да бъде увеличена или намалена от лекаря Ви в рамките на дозов диапазон от 3 mg до 12 mg веднъж дневно за шизофрения или 6 mg до 12 mg веднъж дневно за шизоафективно разстройство. Това зависи от това колко добре Ви действа лекарството.

### **Употреба при юноши**

Препоръчителната начална доза за лечение на шизофрения при юноши на 15 и повече години е 3 mg веднъж дневно, приета сутрин.

За юноши с тегло 51 kg или повече, дозата може да бъде увеличена в рамките на дозов диапазон от 6 mg до 12 mg веднъж дневно.

За юноши с тегло по-малко от 51 kg, дозата може да бъде увеличена до 6 mg веднъж дневно.

Вашият лекар ще реши каква доза да Ви предпише. Количеството, което ще приемате зависи от това колко добре Ви действа лекарството.

### **Как и кога да приемате Парнидо**

Това лекарство трябва да се приема през устата, таблетките трябва да се поглъщат цели с вода или с други течности. Те не трябва да се дъвчат, делят или разтрошават.

Това лекарство трябва да се приема всяка сутрин по време на закуската или без закуска, но винаги по един и същи начин всеки ден. Не редувайте приема на това лекарство един ден със закуска и без закуска на следващия ден.

Активната съставка палиперидон се разтваря, след като веднъж е погълната, а обвивката на таблетката се изхвърля от тялото като отпадъчен материал.

### **Пациенти с бъбречни проблеми**

Вашият лекар може да коригира дозата на това лекарство на базата на бъбречната Ви функция.

### **Пациенти в старческа възраст**

Вашият лекар може да намали дозата на това лекарство, ако бъбречната Ви функция е намалена.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Парнидо**

Свържете се веднага с Вашия лекар. Възможно е да почувствате сънливост, умора, необичайни движения на тялото, затруднение да стоите прав и да ходите, замайване от ниско кръвно налягане и нарушен сърдечен ритъм.

### **Ако сте пропуснали да приемете Парнидо**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако пропуснете една доза, вземете следващата в деня след пропуснатата доза. Ако пропуснете две или повече дози, свържете се с Вашия лекар.

### **Ако сте спрели приема на Парнидо**

Не спирайте да приемате това лекарство, тъй като Вие ще загубите ефекта от лекарството. Вие не трябва да спирате това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това, тъй като симптомите Ви могат да се появят отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

### **Веднага информирайте Вашия лекар, ако Вие**

- Имате кръвни съсиреци във вените, особено в краката (симптомите включват подуване, болка и зачервяване на крака), които може да се придвижат по кръвоносните съдове към белите дробове и да причинят болка в гърдите и затруднено дишане. Ако забележите някой от тези симптоми, веднага потърсете лекарска помощ.
- Имате деменция и изпитате внезапна промяна във Вашето психично състояние или внезапна слабост, или скованост на лицето, ръцете или краката, особено от едната страна, или неясен говор, дори и за кратък период от време. Това може да са признаци на удар.
- Имате повишена температура, скованост на мускулите, изпотяване или понижено ниво на съзнание (нарушение наречено “Невролептичен малигнен синдром”). Може да се наложи неотложно медицинско лечение.
- Сте мъж и получите продължителна и болезнена ерекция. Това се нарича приапизъм.
- Може да се наложи неотложно медицинско лечение.
- Имате неволеви ритмични движения на езика, устата и лицето. Може да се наложи спиране на лечението с палиперидон.
- Получите тежка алергична реакция, характеризираща се с треска, подута уста, лице, устни или език, недостиг на въздух, сърбеж, обрив по кожата и понякога спадане на кръвното налягане (достигаща до “анафилактична реакция”).

### **Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души**

- трудно заспиване или спане
- паркинсонизъм: Това състояние може да включва забавени или нарушени движения, усещане за скованост или напрежение на мускулите (което прави движенията Ви резки), а понякога дори усещане за „замръзване” на движението и последвано от продължаване. Други признаци за паркинсонизъм включват бавна провлачена походка, треперене в покой, повишено слюноотделяне и/или лигавене и загуба на изражение на лицето.
- безпокойство
- сънливост или загуба на внимание
- главоболие

### **Чести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 10 души**

- гръдна инфекция (bronхит), симптоми на настинка, инфекция на синусите, инфекция на пикочните пътища, грипоподобни симптоми
- повишаване на теллото, повишен апетит, намаляване на теллото, понижен апетит
- възбудено настроение (мания), раздразнителност, депресия, тревожност
- дистония: Това е състояние, при което се наблюдават забавени или продължителни неволни контракции на мускулите. Тъй като дистонията може да засегне всяка част от тялото (и да доведе до необичайна поза), тя често включва мускулите на лицето, включително необичайни движения на очите, устата, езика или челюстта.
- замаяност
- дискинезия: Това е състояние, при което се наблюдават неволеви движения на мускулите и може да включва повтарящи се, спастични или усукващи движения или потрепвания.

- тремор (треперене)
- замъглено зрение
- прекъсване на проводимостта между горните и долните части на сърцето, необичайни електрически импулси на сърцето, удължаване на QT интервала от сърцето, забавено биене на сърцето, ускорено биене на сърцето
- ниско кръвно налягане при изправяне (затова някои хора, приемащи Парнидо, може да се почувстват зле, замаяни или да припаднат при рязко изправяне или седане), високо кръвно налягане
- възпалено гърло, кашлица, запушен нос
- коремна болка, коремен дискомфорт, повръщане, гадене, запек, диария, стомашно разстройство, сухота в устата, зъбобол
- повишени стойности на чернодробните трансминази в кръвта
- сърбеж, обрив
- болка в костите или мускулите, болка в гърба, ставна болка
- липса на менструален цикъл
- повишена температура, слабост, изтощение (умора)

### **Нечести нежелани реакции: може да засегнат от 1 на 100 души**

- пневмония, инфекция на дихателните пътища, инфекция на пикочния мехур, инфекция на ушите, тонзилит
- понижен брой бели кръвни клетки, понижен брой тромбоцити (кървни клетки, които подпомагат кръвосъсирването), анемия, нисък брой червени кръвни клетки
- Парнидо може да повиши нивото на хормона, наречен „пролактин”, който се открива с кръвен тест (който може да причини, а може и да не причини симптоми). Когато се появят симптоми на висок пролактин, те може да включват: (при мъжете) подуване на гърдите, затруднено достигане и поддържане на ерекция или други нарушения на сексуалната функция; (при жените) дискомфорт в гърдите, изтичане на мляко от гърдите, пропуснати менструални цикли или други проблеми с месечния Ви цикъл
- поява или влошаване на съществуващ диабет, висока кръвна захар, увеличаване на коремната обиколка, загуба на апетит, водеща до недохранване и ниско телесно тегло, повишени триглицериди в кръвта (мазнини)
- нарушение на съня, обърканост, намалено сексуално желание, невъзможност за достигане на оргазъм, нервност, кошмари
- късна дискинезия (потрепващи или резки движения на лицето, езика или други части на тялото, които не можете да контролирате). Веднага кажете на Вашия лекар, ако се появят неволни ритмични движения на езика, устата и лицето Ви. Може да се наложи спиране на лечението с Парнидо
- конвулсии (пристъпи), припадъци, непреодолимо желание за движение на части на тялото, замаяност при изправяне, нарушено внимание, затруднен говор, загуба или необичайно усещане за вкус, намалена чувствителност на кожата към болка и допир, усещане за изтръпване, боцкане или втвърдяване на кожата
- повишена чувствителност на очите към светлина, очна инфекция или „червено око”,
- сухота в очите
- виене на свят (вертиго), звънене в ушите, болка в ушите
- неравномерен сърдечен ритъм, необичаен запис на електрическите сигнали от сърцето (електрокардиограма или ЕКГ), усещане за ускорено или силно биене в гърдите (палпитации)
- ниско кръвно налягане
- задух, хриптене, кръвотечение от носа
- подуване на езика, инфекция на стомаха или червата, затруднено преглъщане, засилено отделяне на газове
- повишени стойности на ГГТ (чернодробен ензим, наречен гама-глутамилтрансфераза) в кръвта, повишени стойности на чернодробните ензими в кръвта
- обрив (или „копривна треска”), косопад, екзема, акне
- повишени нива на СРК (креатин фосфокиназа) в кръвта – ензим, който понякога се отделя при мускулна травма, мускулни спазми, скованост на ставите, подуване на ставите,

- мускулна слабост, болка във врата
- незадържане (липса на контрол) на урината, често уриниране, невъзможност за уриниране, болка при уриниране
- еректилна дисфункция, нарушена еякулация
- пропуснати менструални цикли или други проблеми с месечния цикъл (жени), изтичане на мляко от гърдите, сексуална дисфункция, болки в гърдите, дискомфорт в гърдите
- подуване на лицето, устата, очите или устните, подуване на тялото, ръцете или краката
- втрисане, повишена телесна температура
- промяна в походката
- чувство на жажда
- гръдна болка, дискомфорт в гръдния кош, неразположение
- колапс

**Редки нежелани реакции: могат да засегнат от 1 на 1000 души**

- очна инфекция, гъбична инфекция на ноктите, инфекция на кожата, кожно възпаление, причинено от акари
- опасно нисък брой на определен вид бели кръвни клетки, необходими за борбата с инфекциите в кръвта Ви
- понижен брой на вид бели кръвни клетки, които подпомагат защитата срещу инфекции, повишен брой еозинофили (вид бели кръвни клетки) в кръвта Ви
- тежка алергична реакция, характеризираща се с повишена температура, подуване на устата, лицето, устните или езика, задух, сърбеж, кожен обрив и понякога понижаване на кръвното налягане, алергична реакция
- захар в урината
- неадекватна секреция на хормона, който контролира обема на урината
- животозастрашаващи усложнения на неконтролиран диабет
- опасно прекален прием на вода, ниска кръвна захар, прекалено пиене на вода, повишено ниво на холестерол в кръвта
- ходене на сън
- липса на движение или отговор в будно състояние (кататония)
- липса на емоции
- невролептичен злокачествен синдром (обърканост, намалена или загуба на съзнание, висока температура и тежка мускулна скованост)
- загуба на съзнание, нарушено равновесие, нарушена координация
- проблеми с кръвоносните съдове в мозъка, кома в резултат на неконтролиран диабет
- неподатливост на стимули, ниска степен на съзнание, треперене на главата
- глаукома (повишено налягане в очните ябълки), повишено сълъзене, зачервяване на очите, проблеми с движението на очите, въртене на очите
- предсърдно мъждене (необичаен сърдечен ритъм), много бързо биене на сърцето при изправяне
- кръвни съсиреци във вените, особено в краката (симптомите включват подуване, болка и почервяване на краката), които могат да се придвижат по кръвоносните съдове до белите дробове, предизвиквайки гръдна болка и затруднено дишане. Ако забележите някой от тези симптоми, веднага потърсете лекарска помощ.
- понижено ниво на кислорода в някои части на тялото (поради намален кръвоток), почервяване
- затруднено дишане по време на сън (сънна апнея), бързо, повърхностно дишане
- пневмония в резултат на вдишана храна, запушване на дихателните пътища, нарушение на гласа
- запушване на червата, незадържане на изпражнения, много твърди изпражнения, липса на движение на чревната мускулатура, което причинява запушване
- пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)
- възпаление на панкреаса
- тежка алергична реакция с подуване, която може да засегне гърлото и да доведе до затруднено дишане
- задебеляване на кожата, суха кожа, зачервяване на кожата, промяна на цвета на кожата,

- люещ се и сърбящ скалп или кожа, пърхут
- увреждане на мускулните влакна и болка в мускулите (рабдомиолиза), необичайна поза
- приапизъм (продължителна ерекция, при която може да се наложи оперативно лечение)
- развиване на гърдите при мъже, нарастване на жлезите в гърдите, секреция от гърдите влагалищно течение
- закъсняване на менструалните цикли, нарастване на гърдите
- много ниска телесна температура, понижаване на телесната температура
- симптоми на синдром на отнемане.

**С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка**

- белодробен застои
- повишено ниво на инсулин (хормон, контролиращ нивото на кръвна захар) в кръвта Ви.

Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани при употребата на друго лекарство, наречено рисперидон, което е много сходно с палиперидон и затова те може да се очакват и при Парнидо: разстройство на храненето, свързано със съня, друг тип проблеми с кръвоносните съдове в мозъка, хъркащи звуци в белите дробове и тежък или животозастрашаващ обрив с мехури и белене на кожата, който може да започне във и около устата, носа, очите и половите органи и да се разпространи по други части на тялото (синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза). Може да се появят проблеми с очите по време на операция на перде. По време на операция на перде може да възникне състояние, наречено интраоперативен синдром на малката зеница (IFIS), ако приемате или сте приемали палиперидон. Ако Ви се налага операция на перде, не забравяйте да кажете на Вашия учен лекар, ако приемате или сте приемали това лекарство.

**Допълнителни нежелани реакции при юноши**

Юношите обикновено имат нежелани реакции, които са подобни на тези, наблюдавани при възрастни, с изключение на следните нежелани лекарствени реакции, които са наблюдавани по-често:

- сънливост или загуба на внимание
- паркинсонизъм: Това състояние може да включва забавени или нарушени движения, усещане за скованост или напрежение на мускулите (което прави движенията Ви резки), а понякога дори усещане за "замръзване" на движението последвано от продължаване. Други признаци на паркинсонизъм включват бавна провлачена походка, треперене в покой, повишено слюноотделяне и/или лигавене и загуба на изражение на лицето
- наддаване на тегло
- общи симптоми на настинка
- безпокойство
- тремор (треперене)
- болки в стомаха
- изтичане на мляко от гърдите при момичетата
- подуване на гърдите при момчетата
- акне
- проблеми с говора
- стомашна или чревна инфекция
- кървене от носа
- инфекция на ухото
- повишаване на триглицеридите (мазнини) в кръвта
- усещане за световъртеж (вертиго).

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София  
Тел.: +359 2 890 3417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Парнидо

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера/бутилката и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Парнидо

- Активното вещество е палиперидон. Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 3 mg, 6 mg или 9 mg палиперидон.
- Другите помощни вещества са: макрогол 200 000, макрогол 7 000 000, макрогол 4000, бутилхидрокситолуен, повидон, натриев хлорид, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, червен железен оксид (E172), хидроксипропил целулоза и целулозен ацетат в ядрото на таблетката и хипромелоза, титанов диоксид (E171), талк, пропилен гликол, жълт железен оксид (E172) (*само за 6 mg таблетки*) и червен железен оксид (E172) (*само за 9 mg таблетки*) в обвивката и шеллак, черен железен оксид (E172) и пропилен гликол в печатното мастило. Вижте точка 2 „Парнидо съдържа натрий“.

### Как изглежда Парнидо и какво съдържа опаковката

3 mg: Бели до сивкаво бели, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с грапава повърхност и с надпис P3 от едната страна на таблетката. Диаметър: приблизително 9 mm.  
6 mg: Кафяво-жълти, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с грапава повърхност и с надпис P6 от едната страна на таблетката. Диаметър: приблизително 9 mm.  
9 mg: Бледо-розови, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с грапава повърхност и с надпис P9 от едната страна на таблетката. Диаметър: приблизително 9 mm.

Парнидо е наличен в кутии съдържащи:

- 28, 30, 56,60, 84, 90 или 98 таблетки с удължено освобождаване в блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

**Това лекарство е разрешено за употреба в държавите — членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:**

Страна-членка	Търговко име на лекарствения продукт
Унгария	Parnido 3 mg retard tableta Parnido 6 mg retard tableta Parnido 9 mg retard tableta
България	Парнидо 3 mg таблетки с удължено освобождаване Парнидо 6 mg таблетки с удължено освобождаване Парнидо 9 mg таблетки с удължено освобождаване
Чешка Република	Parnido
Естония	Parnido
Испания	Parnido 3 mg comprimidos de liberación prolongada EFG Parnido 6 mg comprimidos de liberación prolongada EFG Parnido 9 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Хърватия	Parnido 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem Parnido 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem Parnido 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Литва	Parnido 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Parnido 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės Parnido 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Полша	Parnido
Румъния	Parnido 3 mg comprimate cu eliberare prelungită Parnido 6 mg comprimate cu eliberare prelungită Parnido 9 mg comprimate cu eliberare prelungită
Словения	Parnido 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Parnido 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Parnido 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Словакия	Parnido 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Parnido 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Гърция	Parnido 3 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Parnido 6 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Parnido 9 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

**Дата на последно преразглеждане на листовката:**

26 Април 2024

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителна Агенция по Лекарствата (ИАЛ) <http://www.bda.bg>.