

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

## Navodilo za uporabo

**Hiconcil 250 mg trde kapsule**  
**Hiconcil 500 mg trde kapsule**  
**Hiconcil 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo**  
amoksicilin

**Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

### Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Hiconcil in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Hiconcil
3. Kako jemati zdravilo Hiconcil
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Hiconcil
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

## 1. Kaj je zdravilo Hiconcil in za kaj ga uporabljamo

### Kaj je zdravilo Hiconcil

Zdravilo Hiconcil je antibiotik. Učinkovina je amoksicilin. Amoksicilin spada v skupino zdravil, imenovanih "penicilini".

### Za kaj uporabljamo zdravilo Hiconcil

Zdravilo Hiconcil se uporablja za zdravljenje bakterijskih okužb na različnih delih telesa. Zdravilo Hiconcil se lahko uporablja tudi v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje razjed na želodcu.

## 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Hiconcil

### Ne jemljite zdravila Hiconcil

- če ste alergični na amoksicilin, penicilin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če ste imeli kdaj resno alergijsko reakcijo na kakšen antibiotik. Ta lahko obsega izpuščaj na koži ali oteklost obraza ali žrela.

Ne jemljite zdravila Hiconcil, če kaj od naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Hiconcil.

### Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Hiconcil se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- imate infekcijsko mononukleozo (vročina, suho žrelo, otekle žleze in huda utrujenost);
- imate težave z ledvicami;
- urina ne odvajate redno.

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vas, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Hiconcil.

### Preiskave krvi in urina

Če morate opraviti:

- preiskavo urina (za glukozo) ali preiskavo krvi za jetrno funkcijo,
  - estriolske teste (ki se izvajajo med nosečnostjo, da se preveri, ali se otrok razvija normalno).
- Obvestite zdravnika ali farmacevta, da jemljete zdravilo Hiconcil. Zdravilo Hiconcil lahko vpliva na izvide takšnih preiskav.

### Druga zdravila in zdravilo Hiconcil

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

- Če skupaj z zdravilom Hiconcil jemljete alopurinol (uporablja se pri protinu), obstaja večja možnost za alergijsko kožno reakcijo.
- Če jemljete probenecid (uporablja se pri protinu), se bo zdravnik morda odločil za prilagoditev odmerka zdravila Hiconcil.
- Če jemljete zdravila za preprečevanje krvnih strdkov (npr. varfarin), so lahko potrebne dodatne preiskave krvi.
- Če jemljete druge antibiotike (tetracikline), je lahko zdravilo Hiconcil manj učinkovito.
- Če jemljete metotreksat (zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje raka ali revmatskih bolezni), lahko zdravilo Hiconcil poveča verjetnost za pojav neželenih učinkov.

### Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Hiconcil lahko povzroči neželene učinke in ti simptomi (kot so alergijske reakcije, omotica in krči) lahko povzročijo, da niste sposobni upravljati vozil.

Ne vozite in ne upravljajte strojev, če se ne počutite dobro.

### Zdravilo Hiconcil trde kapsule vsebuje azo barvilo azorubin (E122)

Azo barvilo lahko povzroči alergijske reakcije. Lahko ima neželen vpliv na aktivnost in pozornost pri otrocih.

### Zdravilo Hiconcil prašek za peroralno suspenzijo vsebuje aspartam (E951), natrijev benzoat (E211) in natrij

5 ml peroralne suspenzije vsebuje 8,5 mg aspartama in 7,1 mg natrijevega benzoata.

Aspartam je vir fenilalanina. Lahko vam škoduje, če imate fenilketonurijo, redko genetsko bolezen pri kateri pride do kopičenja fenilalanina, ker se ne more ustrezno odstranjevati iz telesa.

Natrijev benzoat lahko poveča tveganje za zlatenico (rumeno obarvanje kože in oči) pri novorojenčkih (do 4. tedna starosti).

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

## 3. Kako jemati zdravilo Hiconcil

Pri uporabi tega zdravila vedno natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

- Zdravilo Hiconcil lahko jemljete neodvisno od hrane.
- Priporočamo, da med zdravljenjem z zdravilom Hiconcil popijete več tekočine kot običajno.

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

- Odmerke enakomerno razporedite čez dan s presledkom vsaj 4 ure.

#### Hiconcil kapsule:

- Pogoltnite z vodo brez odpiranja kapsule.

#### Hiconcil suspenzija:

- Pred vsakim odmerjanjem steklenico dobro pretresite.
- Suspenzijo odmerite s priloženo brizgo za peroralno dajanje, popijte in poplaknite s tekočino. Po uporabi steklenico takoj dobro zaprite.
- Priprava suspenzije:  
Suspenzijo vedno pripravljajte s prečiščeno vodo ali z vodo, ki ste jo prekuhali in ohladili. Steklenico najprej obrnite in rahlo pretresite, da se prašek v njej sprosti. Za pripravo 100 ml suspenzije potrebujete 92 ml vode. Prašku najprej prilijte približno četrtno potrebne količine vode. Steklenico zaprite in dobro pretresite, da se ves prašek suspendira, nato dodajte preostalo količino vode. Ponovno dobro pretresite. Pripravljena suspenzija mora segati do oznake na steklenici.

Običajni odmerek zdravila Hiconcil je:

#### **Otroci, ki tehtajo manj kot 40 kg**

Vsi odmerki so izračunani na osnovi otrokove telesne mase v kilogramih.

- Zdravnik vam bo svetoval, koliko zdravila Hiconcil je potrebno dati dojenčku ali otroku.
- Običajni odmerek je 40 mg do 90 mg na kilogram telesne mase na dan, razdeljen v dveh ali treh odmerkih.
- Maksimalni priporočeni odmerek je 100 mg na kilogram telesne mase na dan.

#### **Odrasli, starejši bolniki in otroci, ki tehtajo 40 kg ali več**

Običajni odmerek zdravila Hiconcil je 250 mg do 500 mg trikrat na dan ali 750 mg do 1 g vsakih 12 ur, odvisno od resnosti in vrste okužbe.

- **Hude okužbe:** 750 mg do 1 g trikrat na dan.
- **Okužbe sečil:** 3 g dvakrat na dan en dan
- **Lymaska borelioza (okužba, ki jo širijo klopi):** Izolirani erythema migrans (zgodnji stadij – rdeč ali rožnat okrogel izpuščaj): do 4 g na dan. Sistemski znaki (pozni stadij – resnejši simptomi ali ko se bolezen razširi po telesu): do 6 g na dan.
- **Želodčne razjede:** En odmerek 750 mg ali en odmerek 1 g dvakrat na dan 7 dni, skupaj z drugimi antibiotiki in zdravili za zdravljenje razjed na želodcu.
- **Za preprečitev okužbe srca med operacijo:** Odmerek se bo razlikoval glede na vrsto operacije. Morda boste dobili tudi druga zdravila. Zdravnik, farmacevt ali medicinska sestra vam lahko dajo podrobnejša navodila.
- Maksimalni priporočeni odmerek je 6 g na dan.

#### **Težave z ledvicami**

Če imate težave z ledvicami, je odmerek lahko nižji od običajnega odmerka.

#### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Hiconcil, kot bi smeli**

Če vzamete preveč zdravila Hiconcil, so med znaki lahko prebavne motnje (siljenje na bruhanje, bruhanje ali driska) ali kristali v urinu, vidni kot moten urin ali težave pri uriniranju. Nemudoma se posvetujte z zdravnikom. S seboj vzemite škatlo zdravila, da jo boste pokazali zdravniku.

#### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Hiconcil**

- Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite, čim se spomnite.
- Naslednjega odmerka ne smete vzeti prezgodaj, temveč počakajte približno 4 ure, preden vzamete naslednji odmerek.
- Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili izpuščeni odmerek.

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

### Kako dolgo morate jemati zdravilo Hiconcil?

- Zdravilo Hiconcil jemljite tako dolgo, kot vam je svetoval zdravnik, tudi če se počutite bolje. Za premaganje okužbe morate uporabiti vse odmerke. Če nekatere bakterije preživijo, lahko povzročijo ponovitev okužbe.
- Ko končate z zdravljenjem, če se še vedno ne počutite dobro, ponovno obiščite zdravnika.

Med dolgotrajno uporabo zdravila Hiconcil se lahko pojavijo "gobice" (glivična okužba vlažnih predelov telesa, ki lahko povzroči bolečnost, srbenje in bel izcedek). Če se to zgodi, se posvetujte z zdravnikom.

Če jemljete zdravilo Hiconcil dlje časa, lahko zdravnik opravi dodatne preskuse, da preveri, ali ledvice, jetra in kri delujejo normalno.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## 4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Prenehajte z jemanjem zdravila Hiconcil in se nemudoma posvetujte z zdravnikom, če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč:**

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

- Alergijske reakcije; znaki lahko vključujejo: srbenje, izpuščaj na koži, otekanje obraza, ustnic, jezika, telesa ali težave pri dihanju. Ti znaki so lahko resni in občasno je prišlo do smrtnih primerov.
- Izpuščaj ali za buciko velike, ploščate okrogle rdeče pike pod kožo ali podplutbe pod kožo. To je posledica vnetja stene žil zaradi alergijske reakcije. Te spremembe lahko spremljajo bolečine v sklepih (artritis) in težave z ledvicami.
- Zakasnela alergijska reakcija se pojavi običajno 7 do 12 dni po jemanju zdravila Hiconcil; nekateri znaki vključujejo: izpuščaje, vročino, bolečine v sklepih in povečanje bezgavk, zlasti pod pazduhami
- Kožna reakcija, ki jo imenujemo "multiformni eritem", pri kateri se lahko pojavijo: srbeče rdeče vijoličaste lehe na koži, zlasti na dlaneh ali podplatih, koprivkam podobni dvignjeni otekli predeli kože, občutljivi predeli na površini ust, oči in spolovil. Lahko imate zvišano telesno temperaturo in ste zelo utrujeni.
- Ostale resne kožne reakcije lahko vključujejo: spremembo barve kože, bulice pod kožo, mehurjavost, pustule, lupljenje, rdečino, bolečino, srbenje, luščenje. Ti znaki so lahko povezani z vročino, glavoboli in bolečino po telesu.
- Gripi podobni simptomi z izpuščajem, zvišano telesno temperaturo, otečenimi žlezami in nenormalni izvidi krvnih preiskav (vključno z zvišanjem belih krvnih celic (eozinofilija) in jetrnih encimov) (reakcija na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (DRESS)).
- Vročina, mrzlica, suho žrelo ali drugi znaki okužbe ali blage modrice. To so lahko znaki težav krvnih celic.
- Jarisch-Herxheimerjeva reakcija, ki se pojavi med zdravljenjem lymške borelioze z zdravilom Hiconcil in povzroči zvišano telesno temperaturo, mrzlico, glavobol, bolečine v mišicah in izpuščaj na koži.
- Vnetje debelega črevesja z drisko (včasih s krvjo), bolečina in vročina.
- Lahko se pojavijo resni neželeni učinki na jetra. V glavnem se pojavijo pri ljudeh, ki se zdravijo daljše časovno obdobje, moških in starejših. Nemudoma se morate posvetovati z zdravnikom če imate:

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

- hudo drisko s krvavenjem,
- mehurje, rdečino ali podplutbe na koži,
- temen urin ali svetlo blato,
- porumenelost kože ali očesnih beločnic (zlatenica). Glejte tudi o anemiji, spodaj, ki lahko povzroči zlatenico.

To se lahko zgodi med zdravljenjem ali do nekaj tednov po zdravljenju.

**Če se vam pojavi karkoli od zgoraj navedenega, se nemudoma posvetujte z zdravnikom in prenehajte z jemanjem zdravila Hiconcil.**

**Včasih se lahko pojavijo manj hude kožne reakcije, na primer:**

- rahlo srbeč izpuščaj (okrogle, rožnato rdeče lehe), koprivkam podobni otekli predeli na podlakteh, nogah, dlaneh, rokah ali stopalih. Pojavljajo se občasno (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov).

**Če imate katerega od teh znakov, se posvetujte z zdravnikom, saj bo potrebno zdravljenje z zdravilom Hiconcil prekiniti.**

Ostali možni neželeni učinki so:

**Pogosti** (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- kožni izpuščaj,
- siljenje na bruhanje (navzea),
- driska.

**Občasni** (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- bruhanje.

**Zelo redki** (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

- "gobice" (glivična okužba nožnice, ust ali kožnih gub); zdravilo za gobice vam lahko da zdravnik ali farmacevt,
- težave z ledvicami,
- napadi krčev (konvulzije), pri bolnikih, ki jemljejo velike odmerke ali imajo težave z ledvicami,
- omotica,
- hiperaktivnost,
- kristali v urinu, vidni kot moten urin ali težave oziroma bolečine pri uriniranju. Poskrbite, da boste uživali dovolj tekočine, s čimer boste zmanjšali verjetnost teh simptomov.
- jezik se lahko spremeni v rumeno, rjavo ali črno barvo in lahko ima dlakav videz,
- prekomerna razgradnja rdečih krvnih celic, ki povzroči določeno vrsto anemije. Znaki vključujejo: utrujenost, glavobole, zasoplost, omotico, bledost in porumenelost kože in beločnic,
- majhno število belih krvnih celic,
- majhno število celic, udeleženih v strjevanju krvi,
- kri se lahko strjuje dlje časa kot ponavadi. To lahko opazite, če krvavite z nosu ali kadar se porežete.

**Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
 Sektor za farmakovigilanco  
 Nacionalni center za farmakovigilanco  
 Slovenčeva ulica 22  
 SI-1000 Ljubljana

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

Tel: +386 (0)8 2000 500  
Faks: +386 (0)8 2000 510  
e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)  
spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## 5. Shranjevanje zdravila Hiconcil

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

### Kapsule

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

### Prašek za peroralno suspenzijo

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pripravljena suspenzija je uporabna 14 dni, če jo shranjujete v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### **Kaj vsebuje zdravilo Hiconcil**

- Učinkovina je amoksicilin.  
Ena trda kapsula vsebuje 250 mg ali 500 mg amoksicilina v obliki amoksicilin trihidrata.  
5 ml peroralne suspenzije vsebuje 250 mg amoksicilina v obliki amoksicilin trihidrata.
- Druge sestavine trdih kapsul so magnezijev stearat (E470b) in brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551) v jedru kapsule ter titanov dioksid (E171), rumeni železov oksid (E172), rdeči železov oksid (E172), indigotin (E132), azorubin (E122) in želatina (E441) v obojnici kapsule. Glejte poglavje 2 "Zdravilo Hiconcil trde kapsule vsebuje azo barvilo azorubin (E122)".
- Druge sestavine praška za peroralno suspenzijo so aroma limone, aroma breskve-marelice, citronska kislina (E330), natrijev benzoat (E211), aspartam (E951), smukec (E553b), brezvodni natrijev citrat, aroma pomaranče, delno hidrolizirano, uprašeno seme cijamopsisa, brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551) in silicijev dioksid (E551).  
Glejte poglavje 2 "Zdravilo Hiconcil prašek za peroralno suspenzijo vsebuje aspartam (E951), natrijev benzoat (E211) in natrij".

### **Izgled zdravila Hiconcil in vsebina pakiranja**

Trde kapsule po 250 mg in 500 mg so neprozorne, želatinaste; telo kapsule je svetlo roza, pokrovček pa bordo rdeče barve; vsebina kapsul je prašek bele do umazano bele barve.

Prašek za peroralno suspenzijo je bel do rahlo rumenkast prašek.

Na voljo so škatle:

- s 16 (2 x 8) oziroma 100 (10 x 10) trdimi kapsulami v pretisnih omotih
- z 11 g praška za pripravo 100 ml peroralne suspenzije v steklenicah; priložena je brizga za peroralno dajanje.

1.3.1	Amoxicillin trihydrate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

### **Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Hiconcil**

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec**

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.**

### **Splošni nasveti glede uporabe antibiotikov**

Antibiotiki se uporabljajo za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije. Nobenega učinka nimajo proti okužbam, ki jih povzročajo virusi.

Včasih se okužba, ki jo povzročajo bakterije, ne odzove na zdravljenje z antibiotikom. Eden najpogostejših razlogov za to je odpornost bakterij, ki povzročajo okužbo, proti uporabljenemu antibiotiku. To pomeni, da lahko bakterije kljub antibiotiku preživijo in se celo razmnožujejo.

Bakterije lahko postanejo odporne proti antibiotikom zaradi številnih razlogov. Skrbna uporaba antibiotikov lahko pomaga zmanjšati možnost, da bi bakterije postale odporne proti njim.

Ko vam zdravnik predpiše antibiotik, je ta namenjen le za zdravljenje vaše trenutne bolezni. Upoštevajte naslednje nasvete in to bo pomagalo preprečiti pojav odpornih bakterij, ki lahko onemogočijo delovanje antibiotika.

- 1 Zelo pomembno je, da antibiotik jemljete v pravem odmerku, ob pravem času in pravo število dni. Preberite navodila na lekarniški signaturi in če česa ne razumete, prosite zdravnika ali farmacevta za pojasnilo.
- 2 Antibiotika ne smete jemati, če ni bil predpisan posebej za vas. Antibiotik morate uporabiti le za zdravljenje okužbe, za katero je bil predpisan.
- 3 Ne jemljite antibiotikov, ki so bili predpisani drugim ljudem, tudi če so imeli okužbo, podobno vaši.
- 4 Antibiotikov, ki so bili predpisani vam, ne smete dajati drugim.
- 5 Če vam potem, ko ste dokončali zdravljenje z antibiotikom tako, kot vam je naročil zdravnik, ostane kaj antibiotika, morate preostanek vrniti v lekarno za ustrezno odstranitev.