

1.3.1	Sulfamonomethoxine sodium + Trimethoprim
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

NAVODILO ZA UPORABO

Trisulfon peroralni prašek za teleta, kozličke, jagnjeta, prašiče, piščance in kunce

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Trisulfon peroralni prašek za teleta, kozličke, jagnjeta, prašiče, piščance in kunce
Sulfamonometoksin natrij, trimetoprim

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

100 g peroralnega praška vsebuje:

Učinkovini:

Sulfamonometoksin natrij	4,31 g (kar ustreza 4,57 g sulfamonometoksin natrij monohidrata)
Trimetoprim	2,0 g

Sipek prašek brez vonja.

4. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje vseh obolenj pri živalih, ki jih povzročajo mikroorganizmi, občutljivi za trimetoprim in sulfamonometoksin: obolenje dihal, prebavil in sečil, sekundarne infekcijske bolezni in specifične nalezljive bolezni:

Teleta, kozlički, jagnjeta: diareje, koliseptikemije, streptokokni poliartritis, salmoneloze, pastereloza, pnevmonije, stafilokokni abscesi, omfalitisi

Prašiči: kolibaciloza, kokcidioza, atrofični rinitis, salmoneloze, hemofilusne infekcije, pastereloza, toksoplazmoze.

Piščanci: kokcidioza, koliseptikemija, pastereloza, salmoneloze, stafilokokoza, kužna korica.

Kunci: kokcidioza, pastereloza, stafilokokoza, salmoneloza, kolibaciloza.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v primeru okvare ledvic.

6. NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Teleta, kozlički, jagnjeta, prašiči, piščanci in kunci.

1.3.1	Sulfamonomethoxine sodium + Trimethoprim
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Dnevni odmerek za vse teleta, jagnjeta, kozličke in prašiče je 10 g Trisulfon peroralnega praška na 40 kg telesne mase. Zdravilo dajemo enkrat na dan, 5 dni zapored v vodi za pitje ali v krmi.

Piščanci: Odmerek za zdravljenje kokcidioze je 800 g Trisulfon peroralnega praška na 100 l vode za pitje, 3 do 5 dni. Za zdravljenje ostalih bolezni je dnevni odmerek 200 g Trisulfon peroralnega praška na 100 l vode za pitje.

Kunci: 8 g Trisulfon peroralnega praška na 1 l vode za pitje.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Živali naj imajo med zdravljenjem na voljo dovolj pitne vode.

10. KARENCA

Teleta: meso in organi: 10 dni

Kozlički: meso in organi: 10 dni

Jagnjeta: meso in organi: 10 dni

Prašiči: meso in organi: 10 dni

Kunci: meso in organi: 10 dni

Piščanci: meso in organi: 10 dni

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene proizvodnji jajc za prehrano ljudi.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zaščito pred svetlobo in vlago.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na obojnini po EXP.

Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Nekatera zdravila, kot so fenilbutazon, salicilati in indometacin pri vezavi na beljakovine v krvni plazmi izpodrivajo sulfonamide in tako povečujejo njihovo učinkovitost in toksičnost. Derivati paraaminobenzojeve kisline, kot so lokalni anestetiki prokain, terakain ter prokainamid, pa zmanjšujejo učinkovitost protimikrobnega delovanja sulfonamidov, ker dvigujejo nivo paraaminobenzojeve kisline v organizmu.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO

29.6.2017

1.3.1	Sulfamonomethoxine sodium + Trimethoprim
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI

15. DRUGE INFORMACIJE

Lončki po 100 g, vreče po 20 g, 100 g in 1 kg peroralnega praška.
Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.